

*Antennarius Lindgreeni*, eene nieuwe soort van *Banka*.

Eenige dagen geleden ontving ik door de welwillendheid van den heer J. J. LINDGREEN, officier van gezondheid 1<sup>e</sup> kl. te Muntok, eene soort van *Antennarius*, welke ik als nieuw voor de wetenschap beschouw en ter eere van den toezender heb genoemd.

*Antennarius Lindgreeni* Blkr.

Antenn. corpore ovali compresso, altitudine  $2\frac{1}{2}$  circiter in ejus longitudine, latitudine  $2\frac{1}{2}$  circiter in ejus altitudine; oculis diametro 7 fere in longitudine maxillae superioris; rictu subverticali postrosum descendente; maxilla superiore  $5\frac{1}{2}$  in longitudine corporis; dentibus acutis seriebus internis seriebus externis longioribus, intermaxillaribus anticis triseriatis posticis biseriatis, inframaxillaribus vomerinisque triseriatis, palatinis biseriatis; thurmis dentalibus vomerinis spatio glabro lato a se invicem remotis; thurmis palatinis thurmis vomerinis multo minoribus iisque approximatis; apertura branchiali rotunda oculo multo majore; cute toto corpore spinulis plurimis bifurcatis conspicuis valde scabra; capite superne lateribusque et dorso antice tuberculis osseis parvis seriatim; fimbriis capite superne dorso, lateribus, ventre pinnisque parvis parvis, capite inferne aliquot oculo multo longioribus plus minusve arborescentibus; radio rostro libero tuberculo scabro apice rostri inserto 5 circiter in longitudine corporis, apice multifimbriato fimbriis latis longis; pinna dorsali spinosa spina 1<sup>a</sup> libera obtusa antrorsum flexili, spina 2<sup>a</sup> spina 1<sup>a</sup> duplo fere longiore maxilla superiore brevior membrana lata paulo antrorsum flexili; dorsali radiosa analique rotundatis altitudine subaequalibus, dorsali anali plus duplo longiore; caudali obtusa rotundata 4 circiter in longitudine corporis; ventralibus maxilla superiore brevioribus; corpore pinnisque rubris violaceo-nigro reticulatis cellulis retis irregularibus plurimis oculo multo majoribus; pinnis dimidio libero violaceo-nigro variegatis, caudali vittis 8 vel 9 transversis undulatis inaequalibus nigris; radio rostrali rubro et fuscato annulato fimbriis nigro-violaceis.

B. 6. D. 2—13 (omn. fiss.). P. 9 (omn. simpl.) V. 5 (omn. simpl.) A. 7 (postic. tantum simpl.) C. 9 (omn. fiss.).

Habit. Muntok, Bankae insulae, in mari.

Longitudo speciminis unici.

Aann. Deze *Antennarius* is het naaste verwant aan *Antennarius urophthalmus* Blkr (*Chironectes caudimaculatus* Richds. nec Rüpp.) en *Antennarius notophthalmus* Blkr. Van deze beide soorten heb ik eerstgenoemde beschreven ik mijne bijdrage tot de kennis der ichtiologische fauna van Riouw (Nat. Tijdschr. Ned. Indië II p. 488). Toen nog niet in het bezit zijnde van

de zoölogie der reis van de Erebus en Terror, was het mij onbekend, dat dezelfde soort onder den Rüppellschen naam van *Cheironectes caudimaculatus* door den heer RICHARDSON was beschreven en afgebeeld. De heer RICHARDSON houdt echter ten onrechte zijne *Cheironectes caudimaculatus* voor dezelfde soort als de gelijknamige Rüppellsche. Zij is daardoor reeds er van te onderkennen, dat er de bovenkaak niet, zooals bij de Rüppellsche soort, naar voren, maar naar achteren is gericht en dat de kleurteekening er aanmerkelijk verschilt en de staartvin veelreijige en veel talrijker oogen heeft. De soortnaam van den heer RICHARDSON alzo niet voor deze soort kunnende blijven bestaan, als tot verwarring leidende, kan de door mij voorgeslagene geschikt behouden blijven, hetwelk niet wegneemt dat de soort toch door den heer RICHARDSON het eerst is bekend gemaakt.

*Antennarius Lindgreeni* Blkr onderscheidt zich zoo wel van *Antennarius urophthalmus* Blkr als van *Antennarius notophthalmus* Blkr door aanmerkelijk langere bovenkaak en daardoor grootere bekspleet, alsmede door de lengte en talrijkheid der snuitstraaldraden. Bovendien mist zij de kenmerkende groote geringde rugvinvlek van *Antennarius notophthalmus* en de staartvinoogen van *Antennarius urophthalmus*, enz.

---

### *Nieuwe Mollusken van den Indischen Archipel.*

*Helix euchroes* Pfr. T. semiobtectae perforata, solidula, oblique irregulariter striata et sub lente minutissime granulata, nitidula, rubello-falva, fasciis castaneis et unica latiore candida ad suturam ornata; spira regulariter conica, sursum lilaceo-rosea, apice acutiuscula; anfr. 7 modice convexi, sensim accrescentes, ultimus non descendens, subrotundatus; apertura perobliqua, subthombeo-lunaris, intus griseo-albida; perist. tenue, extus castaneum, marginibus callo tenui junctis, dextro late expanso et reflexiusculo, basali substricto, reflexo, cum columellari subverticali, leviter arcuato, in laminam triangularem, planam dilatato, angulum formante.—Diam. maj. 36, min. 28, alt. 35 mill. (Coll. Gruner.)

Habitat in Archipelago indico.

(Ueber *Helix pileus* Müll. and einige nahe verwandte Formen von Dr. L. P. PFEIFFER Malokozoöl. Bl. 1854 p. 57).